

**CLAMPAGE PRECOCE VERSUS CLAMPAGE TARDIF
DU CORDON OMBILICAL :
REVUE DE LA LITTERATURE ET
PROJET DE PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE**

Justine ARNAUD

Étudiante HES – Filière Sages-femmes et hommes sages-femmes

Emilie GOMAR

Etudiante HES – Filière Sages-femmes et hommes sages-femmes

Directrice de mémoire : Fabienne SALAMIN

**MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN 2008 EN VUE DE L'OBTENTION D'UN
DIPLOME DE SAGE-FEMME / HOMME SAGE-FEMME HES**

**Haute école cantonale vaudoise de la santé
Filière Sages-femmes et hommes sages-femmes**

RESUME

Le meilleur moment pour clamber le cordon ombilical n'est pas consensuel.

L'objectif de notre travail a été de déterminer quel est le moment le plus adéquat pour clamber le cordon après la naissance. Pour cela, nous nous sommes basées sur les principes de l'Evidence-Based Medicine et avons élaboré une stratégie de recherche de littérature, analysé des essais contrôlés randomisés de bonne qualité méthodologique et effectué une revue de la littérature.

Nos résultats ne nous ont pas montré d'effets délétères du clamping tardif du cordon ombilical sur la santé néonatale. Cependant, les issues maternelles n'ont pas été suffisamment investiguées afin de pouvoir tirer des conclusions pour la pratique.

Dans le but de combler les lacunes, nous avons réalisé un projet de protocole de recherche clinique.

Des résultats novateurs concernant les effets du moment du clamping du cordon ombilical sur la santé maternelle impliqueraient une remise en question de certaines pratiques professionnelles.

MOTS-CLES

clamping du cordon ombilical, troisième phase du travail, hémorragie de la délivrance, anémie néonatale, polycythémie néonatale, ictère néonatal, adaptation néonatale.

justinearnaud@voila.fr et emilie.gomar@gmail.com